

*Quia organa  
in caua iecoris  
sede posita  
sunt spectanda.*

locum reposito, illum in sinistram latus cum intestinis trahi<sup>k</sup> curabis: iecur uero, ut ipsius ca-  
uum adamussim uideas, in dextrum & uelut sursum protrudes. deinde postquam obiter bilis  
uesiculam contentiplatus fueris, sectionem omnium totius corporis molestissimam maximeq;  
operosam aggredieris. Bilis namque meatus, & neruorum & arteriarum uenarumq; rami (qui  
omnes simul inferiori membrana omenti ad cauum iecoris colligantur) nunc ueniunt retuliori  
cultello examinandi, ne acutioris cultelli mucrone uenam quampiam pertundas, sicq; omnia  
cruore obliteres. Offertur itaq; primum neruulus ab humiliori uentriculi orificio iecoris cauo  
insertus, qui à sexti neruorum cerebri paris propaginibus superius uentriculi orificiū ad eūtibis  
pendet. Vbi hunc à uicinis organis diremeris, à membranarū cōnexu diuidendus est alter ner-  
uus, qui uno ramo iecoris cauo, altero autem bilis uesiculam accedit. Huic neruo arteria atten-  
ditur parem cum illo efficiens distributionem, ac mox post neruum liberanda. Huius uero, ut  
& nerui initium, paulo post inuenies. nunc enim sat est, hæc inuicem iuxta iecoris cauum sepa-  
rare, hicq; eorum seriem discere. Sub arteria bilis uesiculæ meatus cōsistunt, à portæ uena iam  
liberandi: primum duo illi, qui ex iecoris cauo ex multis furculis colliguntur, & ilico in unum  
coeunt meatum, qui una parte in bilis fertur uesiculā, altera in duodenum intestinum. Vbi hos  
à portæ uena ad intestinum usque & bilis uesiculam seceueris, illam pollice ad eō comprimes,  
ut meatus bile turgentes cōmodius appareant, & num quis meatus ab hac uesicula in uentri-  
lum pertingat, animaduertas: quem si non inuenieris, acu meatum in intestina properantem le-  
uiter pertundes, ut profluens bilis argumēto sit, nullum processum ab illo meatu tibi incuria  
præfictum. Postremo uena portæ est examinanda, ac ilico atque ipsius circumscriptionē qua  
ex iecore prodiit animaduertes, propagines illius obtusiori cultello sunt inquirendæ, semper  
arteriæ & nerui, uenæ per uniuersum ipsius seriem attensorū, diligenti habita ratione. Primum  
itaq; furculos portæ aggredieris, qui bilis uesiculæ exporriguntur: deinde cum qui ferē citra ar-  
teriæ consortium in dextrā uentriculi sedem, iuxta ipsius inferioris orificij posteriorem regio-  
nem modica ramorum serie digeritur. Hunc subsequitur, qui dextrā fundi uentriculi partem  
& medium superioris omenti membranæ perrepat. Post hunc, qui duodeno nobis uocato  
intestino deriuatur, quem secundum intestini longitudinē in<sup>m</sup> corpus quoddam glandulosum  
carneumq; descendere obseruabis, si modò (ut iam monuimus) retusiori cultello uenam, illiq;  
accumbentem neruum, arteriamq; nudare studueris. Modò magnam portæ<sup>l</sup> distributionem  
deteges, truncum, qui mesenterium adit, obiter tantum expendes. Atque hoc in præsentia reli-  
cto, ad truncum qui lienipotissimum exporrigitur, te cōferes. Atque ut hunc cōmodè uideas,  
uentriculus & intestina tibi ueniunt ad eū<sup>m</sup> modum aptanda, quo situabantur dum inferiori  
omenti membranam intuebaris, ac uentriculum sodalis manu sursum attolli, & intestina deor-  
sum premi curares. Patente itaq; nunc tibi superiori sede humilioris omenti membranæ, accu-  
rata cura ramos omnes minoris portæ trunci examinabis, quos omnes aut uentriculo, aut lienī,  
aut ipsi omento, coloq; intestino in homine exporrigi adinuenies. Interea uero quā ramos hos  
inquires, ipsosq; à glandoso corpore illos suffulciente liberabis, omnibus ferē arteriam, multis  
autem neruum attendi obseruabis.<sup>p</sup> Arteriarum radix sese offert in elatissima inferioris omenti  
membranæ sede, ubi etiam occurret magnæ arteriæ in mesenterium deducendæ origo: deinde  
utrinq; unus sese offeret neruus, ad magnæ hæc descendens arteriæ latera exiliens, sexti neruo-  
rum cerebri paris propaginum, quæ costarum radicibus exporrigitur, soboles. cuius ramuli  
una cum arterijs dum uenam nudas, in conspectum semper ueniunt. Iam & grandioris portæ  
trunci & paulo antè dictæ arteriæ & nerui per mesenterium seriem, & quæ inibi diuisionibus  
præfunt glandulas<sup>q</sup> inuestigare tempestiuum est. Primum itaq; solis manibus intestina hinc  
inde inuicem diduces, & nunc in dextrum, nunc in sinistram latus reuolues, ut citra sectionem  
mesenterij naturam perfunctoriè cōtempleris. Deinde obtusiori cultellulo maiorem uenæ por-  
tæ truncum & dictam nuper arteriam & neruum inuicē liberabis, & dein ut uniuersum ipso-  
rum ductum, & glandulas diuicationibus interiectas intuearis, unguibus unam mesenterij  
membranam ab aliā diuelles. Ac hoc per uniuersum mesenterium haud uenit tentandum, sus-  
fecerit enim in præsentia à centro ipsius aliquot uasorum furculos ad tenuia usq; intestina dedu-  
xisse, ac mox<sup>r</sup> alteram mesenterij arteriam aggredi, à magna arteria ipsi post seminalium arte-  
riarum ortum depromptam. Atque hanc promptè inuenies, si cum intestinis mesenterium in  
dextrum latus reuolueris, unguibusq; aut obtusiori cultello mesenterij membranas, quæ co-  
lo sub sinistri renis sede adnascitur, inuicē dirimere conaberis. Hic enim ilico eius arteriæ rami  
uenis commissi sese offerēt, rursus arteriæ radicem cōmonstrantes. Quam ubi inuenieris, ipsius  
diuicationem prosequere, ut discas quā hæc cum uena mesenterio suffulta recto intestino ra-  
mos exporrigat. Parum modò sollicitus, etiam si uenæ huius extrema in rectum intestinum inseri

non

non intuearis: id enim paulo post fiet facilius. Hac sa-  
uentriculi, iecoris, lienis & mesenterij situs, præterea  
& arteriarum & neruorum furculi sunt examinandi  
in illis organis uidentia super sunt, commode intue-  
ri. Maiusculæ instar semicirculi obliquatæ acui filum,  
dum est. hanc per mesenterium sub recto intestino, c  
stini facibus sursum ad coli amplitudinem protrusis,  
iam quod superest filo, facies uinculo proximas ex r  
& interuallo trium digitorum plus minus interposito  
us uinculum trajicies, secundo rectum intestinum ita  
menti sit reliqui. Deinceps nouacula rectum intesti-  
rem ipsius partem sensim à mesenterio obtusiori not  
uulneres) resecabis, & dehinc colum, ileum, ieiunum  
cipium liberabis, intestinis in peluim repositis. Atq;  
pingues tunicas connexus sedulo est animaduerten  
testina implicante. Vbi uero ad ieiuni usque princip  
duobus uinculis intercipies, ita ut elatius uinculum  
sit, non autem elatius conscendat. Intestina à uentre li  
bemus, abluenda offeres, ut si uisum fuerit abluturum  
re queas. Patavij & Bononiæ postquā abluta scholar  
do uesicæ instar inflari curauimus: ita enim nō solum  
est (quantum quatuordecim uulnas ferē atquet) uerū  
mus. Tunicas autem, intestinis ad hunc modum exp  
parcet enim mesenterij pars intestinis proxima, quæ  
riori, altera inferiori. Has si unguibus ab intestinis di  
tunicam intueberis, ac qua ratione hæc à peritonæo  
mesenterij membranas paulo post à peritonæo enasce  
uantur discas. Hac tunica ab intestinis distracta, obtu  
stini longitudinem duces, studiose præcauens ne id  
unguibus diuelles, & absq; negotio secundā intestino  
si id iuxta rectum moliaris. in tenuibus enim intestini  
Nunc licebit intestina inuertere, atque unum eius intel  
ficium examinare. Verū intestinarum tunicas liceb  
scindere: quantum illis exemptis, id fieri malim. In  
de conspicua, & humiliori membrana omenti sufful  
eum quem dixi modum auferre: idq; tunc potissimum  
diutius quā tibi ex usu esset, intestina forte asseruare  
quem modò quoque cum liene eximere soleo, neruis  
minatis, aliās enim uentriculum relinquere consueui, q  
commodius ipsius orificium neruiq; examinari possent  
docebo: quum autē gulam persequar, ut relictum deb  
que quantum fieri licet in homine, peritonæum à septe  
orificium<sup>e</sup> auellere conaberis, ut tertiæ uentriculi tunica  
à uentriculi orificio liberaueris, studebis utique etia  
cere, ut ex tertia uentriculi tunica superiorem omenti m  
acu sub superiori orificio uentriculi traiecto, uinculur  
uinculum stomachum à uentriculo transuersim libera-  
tre eleuato, non tamen penitus (ne uenas rumpat) exe  
mesenterij ex peritongo originem discas, solis unguib  
uinculis uerò pleraq; intercipies. <sup>8</sup> Primum simul omni  
scilicet uenam, arteriam, & bilis meatum, aut si lubet si  
post hæc arteriarum radicibus, quæ mesenterio & infe  
runtur, illa sanè arteria nō omitta, quæ sub seminalibus  
his omnibus unum duntaxat uinculum addi sat est, qu  
nuimus) iniicere nihil prohibeat: imò, idq; præcipue a  
conduxerit. Inductis in hunc modum uinculis, porta,  
culum in corpore maneat diuidentur, & oculus solarum